**Fessalgies et algies périnéales
savoir y penser**

Dr Kévin Buffenoir MD, PhD
Pr Roger Robert – Pr Olivier Hamel
neurochirurgie/neurotraumatologie
CHU de Nantes

Algies pelvi-périnéales
3,8% des femmes de 15 à 75 ans

Névralgies périnéales
Syndrome(s) canalaire(s)

Les syndromes bien définis

Névralgie pudendale

Névralgie clunéale

Syndrome du piriforme

La situation clinique

- Douleur fessière
- Prépondérante en station assise
- Avec ou sans irradiation périnéale
- Avec ou sans irradiation sciatalgique, sans rachialgie
- Accompagnée de points douloureux gâchettes au niveau fessier

Situation fréquente, mésestimée car orpheline de spécialité d'origine

Syndrome de l'obturateur interne

La topographie clinique est constamment confirmée par l'imagerie

Le muscle obturateur interne

- Un chef fessier en rapport avec le sciatique et le nerf cutané postérieur de la cuisse
- Un chef pelvien en rapport avec le nerf pudendale

Infiltrations musculaires

- Muscle Piriforme
- Muscle Obturateur interne
- *A titre de test diagnostic*
- *Avant injection de Botox*

Syndrôme piriforme et/ou obturateur interne
Fesso- Sciatgie plus ou moins tronquée
Non insomniante
Non déficitaire
Se majorant en position assise
Syndrôme myofascial piriforme et/ou obturateur interne

Critères de positivité du test infiltratif diagnostic

- **Compte rendu détaillé de l' infiltration**
Conserver l' imagerie
- **Scanner ET produit de contraste**
- Anesthésie locale de la structure+++ (testdg)
- **Evaluation de la douleur en position douloureuse**
(souvent assise)
- EVA pré et post infiltration

Traitement symptomatique: rééducation

- Technique du contracter-relâcher:
 - Contracter pendant l' inspiration
 - Relâcher pendant l' expiration
- Étirement lent, progressif, indolore
 - Éviter le réflexe myotatique
- Retour lent

Piriforme

Obturateur interne

Névralgies pudendales

Critères de Nantes

(Kamina)
A: Ilio-inguinal, Ilio hypogastric, Genito-femoral nerves
B: Pudendal nerve
C: Inferior Cluneal nerve

- Douleurs périnéales (anus, lèvres ou scrotum, verge ou clitoris)
- Non déficitaires
- Non insomniales
- Positionnelles
 - Augmentant en position assise
 - Diminuant couché ou debout
- Infiltration test pudendale au niveau du ligament sacro-épineux ou en aval (Alcock) positive

Nerf Pudental

Labels: Lgt sacro-épineux, Lgt sacro-tubéral, Canal pudental, Branches périnéales, S3, Processus falciforme

Nerf Pudental : conflits possibles

Pince ligamentaire
 •Lgt Sacro-Epineux
 •Lgt Sacro-Tubéral

Canal Pudental (Alcock)
 •Apon. Obturateur interne
 •Processus falciforme

Infiltration au niveau du Ligament Sacro épineux

Labels: Épine sciatique, Ligament sacroépineux et muscle coccygien, m. Obturateur interne, Vx pudendaux, rectum, vessie

Infiltration au L.S.E ligament sacro-épineux

Evaluation immédiate test LSE

- **Positif:**
 - Névralgie pudendale
 - Névralgie clunéale
- **Négatif:**
 - Mauvais placement (erreur technique ou variabilité anatomique)
 - Etiologie en amont de l'épine
 - Erreur diagnostique

Infiltration au canal d'ALCOCK

- Canal d'Alcock
- Nerf sciatique
- Muscle obt interne

Infiltration au canal d'Alcock

Evaluation Immédiate test Alcock

- **Bloc positif**
 - participation n pudendal
 - Participation n obturateur
 - Pathologie musculaire obturatrice
 - Participation clunéale si bas situé
- **Bloc négatif**
 - Pathologie en amont
 - Erreur diagnostique

CHIRURGIE

INCISION

GLUTEUS MAXIMUS

LIGAMENT SACRO-TUBERAL

SECTION DU LSE

DISSECTION DU NERF

TRANSPOSITION

Nerf clunéal inférieur

- Couvre:
 - le pli fessier
 - La partie basse de la fesse
 - Paraanal
 - Mediolabial
 - Silon genito crural
- Exopelvien

Névralgie clunéale: Douleurs fessopérinéales, positionnelles, non insomniantes, épargnant le plus souvent la verge et le clitoris

Conclusions

- Infiltration **INDISPENSABLE** au **diagnostic**
- Utilisation **INDISPENSABLE** d'**anesthésiques locaux**
- Utilisation **TRES** souhaitable de **produit de contraste**
- **EVALUATION COMPARATIVE** en position douloureuse **OBLIGATOIRE**

Libération transposition chirurgicale du nerf pudendal

Chirurgie rapide
Faible taux de complication
MAIS
Environ 30% de patients peu ou pas soulagés